

Vaccins	Modalités	Rappels
<b>Fièvre jaune</b>	1 injection (au moins 10 jours avant le départ)	Aucun, sauf cas particulier : - Vaccination avant l'âge de 2 ans ou pendant une grossesse - Personnes immunodéprimées - Circulation active du virus
<b>Hépatite A</b>	<u>2 injections</u> : - 1 injection 4 semaines avant le départ ; - rappel : 1 à 3 ans après la 1 <sup>re</sup> injection.	Aucun sauf en cas d'immunodépression
<b>Hépatite B</b>	<u>3 injections</u> : - 2 doses à 1 mois d'intervalle ; 3 <sup>ème</sup> dose 5 mois après la 2 <sup>ème</sup> - schéma rapide avec 3 injections en 3 semaines, rappel à 1 an	Aucun sauf cas particuliers (immunodépression, exposition professionnelle)
<b>Typhoïde</b>	1 injection (au moins 10 jours avant le départ)	Tous les 3 ans si nouveau séjour à risque
<b>Méningocoques (ACYW135)</b>	1 injection (au moins 10 jours avant le départ)	Aucun, sauf en cas d'immunodépression, 5 ans après
<b>Encéphalite japonaise</b>	<u>2 injections</u> : - 1 injection si possible 6 semaines avant le départ - 2 <sup>ème</sup> injection 4 semaines après la 1 <sup>ère</sup> injection (1 semaine si départ imminent et adulte)	1 à 2 ans, puis 10 ans
<b>Encéphalite à tiques</b>	<u>3 injections</u> : - 1 injection si possible 2 mois avant le départ (minimum 2 semaines); - 2 <sup>ème</sup> injection 1 mois après la 1 <sup>ère</sup> injection (voire 2 semaines); - 3 <sup>ème</sup> injection au moins 4 mois après la 2 <sup>ème</sup> injection.	3 ans, puis tous les 5 ans
<b>Rage</b>	<u>3 injections</u> : - 1 injection au moins 1 mois avant le départ ; - 2 <sup>ème</sup> injection 7 jours après la 1 <sup>ère</sup> injection ; - 3 <sup>ème</sup> injection 14 à 21 jours après la 2 <sup>ème</sup> injection.	Aucun, sauf en cas d'exposition (2 rappels à 3 jours d'intervalle dans les 5 jours suivant une exposition)

**NB** : la mise à jour des vaccins du calendrier vaccinal français est indispensable pour les adultes comme pour les enfants